

1-INF-450 Logika pre informatikov

Zimný semester 2013/14

11. prednáška

Ján Komara

Obsah 11. prednášky

Zopakovanie

Čiastočne rekurzívne funkcie

Výpočtový model pre čiastočne rekurzívne funkcie

Aritmetizácia výpočtového modelu

Záver

Zopakovanie

Cieľ predmetu

- ▶ Vybudovať matematické základy deklaratívnych programovacích jazykov.

Stručná osnova predmetu

- ▶ Primitívne rekurzívne funkcie
 - ▶ Aritmetizácia dátových štruktúr.
 - ▶ Regulárne rekurzívne definície s mierou.
- ▶ Obecné rekurzívne funkcie
 - ▶ Regulárne rekurzívne definície do dobre založených relácií:
 - ▶ Ackermannova funkcia (1928),
 - ▶ univerzálna funkcia pre primitívne rekurzívne funkcie.
- ▶ Čiastočne rekurzívne funkcie
 - ▶ Kleeneho prvá veta o rekurzii (veta o pevnom bode).
 - ▶ Kleeneho veta o normálnej forme.
 - ▶ Churchova téza a algoritmicky nerozhodnuteľné problémy.

Zopakovanie

Primitívne rekurzívne funkcie (charakterizácia)

Trieda primitívne rekurzívnych funkcií je najmenšia trieda funkcií, ktorá obsahuje funkciu nasledovníka $S(x) = x + 1$, funkciu predchodcu $x \div 1$ a je uzavretá na explicitné definície a regulárne rekurzívne definície s mierou.

Obecne rekurzívne funkcie (definícia)

Trieda obecné rekurzívnych funkcií je najmenšia trieda funkcií, ktorá obsahuje funkciu nasledovníka $S(x) = x + 1$, funkciu predchodcu $x \div 1$ a je uzavretá na explicitné definície a regulárne rekurzívne definície do dobre založených relácií.

Obecne rekurzívne funkcie, ktoré nie sú primitívne rekurzívne

- ▶ Ackermannova funkcia (1928).
- ▶ Univerzálna funkcia pre primitívne rekurzívne funkcie.

Zopakovanie

Čiastočné funkcie

n -árna čiastočná funkcia f je jednoznačná relácia z N^n do N :

$$(\vec{x}, y) \in f \wedge (\vec{x}, z) \in f \rightarrow y = z.$$

Čiastočné funkcie sú usporiadané množinovou reláciou $f \subseteq g$.

Silná rovnosť (Kleene)

$\tau \simeq \rho$ platí, ak jedna z nasledujúcich podmienok je splnená:

- ▶ Výrazy τ, ρ sú definované a ich hodnoty sú rovnaké.
- ▶ Výrazy τ, ρ nie sú definované.

Ak termy τ, ρ obsahujú len funkcie, potom $\tau \simeq \rho \leftrightarrow \tau = \rho$.

Označenie:

- ▶ $\tau \downarrow$, ak výraz τ je definovaný (má hodnotu, konverguje).
- ▶ $\tau \uparrow$, ak výraz τ nie je definovaný (nemá hodnotu, diverguje).

Zopakovanie

Kleeneho prvá veta o rekurzii

Funkcionálna rovnica v neznámej f :

$$f(x_1, \dots, x_n) \simeq \tau[f; x_1, \dots, x_n]$$

má najmenšie riešenie n -árnu čiastočnú funkciu $\bigcup_{i=0}^{\infty} f_i$, ktorá je limitou reťazca $f_0, f_1, f_2, \dots$ definovaného predpisom

$$f_0 = \emptyset^{(n)}$$

$$f_{i+1}(x_1, \dots, x_n) \simeq \tau[f_i; x_1, \dots, x_n].$$

Poznámka

Toto je prvá časť prvej vety o rekurzii. V druhej časti sa tvrdí, že najmenšie riešenie je vypočítateľné.

Zopakovanie

Rekurzívne definície čiastočných funkcií

Sú to definície čiastočných funkcií v tvare

$$f(x_1, \dots, x_n) \simeq \tau[f; x_1, \dots, x_n].$$

Čiastočnou funkciou, ktorá je definovaná uvedeným vzťahom, rozumíme najmenšie riešenie tejto funkcionálnej rovnice v triede n -árnych čiastočných funkcií. Existencia takého riešenia plynie z prvej vety o rekurzii.

Poznámka

Regulárne rekurzívne definície do dobre založených relácií

$$f(x_1, \dots, x_n) = \tau[f; x_1, \dots, x_n]$$

sú špeciálnym prípadom rekurzívnych definícií čiastočných funkcií.

Zopakovanie

Výpočtový model

- ▶ Výpočet prebieha na monadických numeráloch: $\underline{x} \equiv \overbrace{S \dots S}^{x\text{-krát}}(0)$.
- ▶ Jeden krok výpočtu: $\rho \triangleright_1 \sigma$. Vyberáme najľavejší redex:

$$\begin{array}{ll} D(\underline{0}, \rho_2, \rho_3) \triangleright_1 \rho_3 & D(\underline{x+1}, \rho_2, \rho_3) \triangleright_1 \rho_2 \\ g_i(\underline{y_1}, \dots, \underline{y_{m_i}}) \triangleright_1 \underline{g_i(y_1, \dots, y_{m_i})} & \text{pre } i = 1, \dots, k \\ f(\underline{x_1}, \dots, \underline{x_n}) \triangleright_1 \tau[f; \underline{x_1}, \dots, \underline{x_n}]. & \end{array}$$

- ▶ Viac krokov výpočtu: $\rho \triangleright \sigma$.

Veta (Ekvivalentnosť výpočtovej a definičnej sémantiky)

Platí

$$f(\underline{x_1}, \dots, \underline{x_n}) \triangleright \underline{y} \leftrightarrow f(x_1, \dots, x_n) \simeq y.$$

Čiastočne rekurzívne funkcie

Definícia triedy čiastočne rekurzívnych funkcií

- ▶ Základné funkcie:
 - ▶ funkcia nasledovníka $S(x) = x + 1$,
 - ▶ funkcia predchodcu $P(x) = x \div 1$.
- ▶ Explicitné definície čiastočných funkcií:

$$f(x_1, \dots, x_n) \simeq \tau[x_1, \dots, x_n].$$

- ▶ Rekurzívne definície čiastočných funkcií:

$$f(x_1, \dots, x_n) \simeq \tau[f; x_1, \dots, x_n].$$

Funkcia je rekurzívna, ak je to totálna čiastočne rekurzívna funkcia.
Predikát je rekurzívny, ak taká je jeho charakteristická funkcia.

Čiastočne rekurzívne funkcie

Rekurzívne ododenia

Sčítanie

$$x + y \simeq \text{if } x \neq 0 \text{ then } S(P(x) + y) \text{ else } y.$$

Odčítanie

$$x \div y \simeq \text{if } x \neq 0 \text{ then if } y \neq 0 \text{ then } P(x) \div P(y) \text{ else } x \text{ else } y.$$

Násobenie

$$x \cdot y \simeq \text{if } x \neq 0 \text{ then } P(x) \cdot y + y \text{ else } 0.$$

Umocňovanie

$$x^y \simeq \text{if } y \neq 0 \text{ then } x \cdot P(x)^y \text{ else } 1.$$

Výpočtový model pre čiastočne rekurzívne funkcie

Rekurzívne termy a funkčné symboly (príklad)

Primitívne rekurzívna definícia

$$\begin{aligned}0 + y &= y \\ S(x) + y &= S(x + y).\end{aligned}$$

Regulárna rekurzívna definícia

$$x + y = \mathbf{if} \ x \neq 0 \ \mathbf{then} \ S(P(x) + y) \ \mathbf{else} \ y.$$

Rekurzívna definícia so silnou rovnosťou

$$x_1 + x_2 \simeq D\left(x_1, S(P(x_1) + x_2), x_2\right).$$

Rekurzívny funkčný symbol

$$\lambda_2.D\left(x_1, S \text{ f}_2(P(x_1), x_2), x_2\right).$$

Výpočtový model pre čiastočne rekurzívne funkcie

Rekurzívne termy a funkčné symboly

Induktívna definícia triedy rekurzívnych termov a triedy rekurzívnych funkčných symbolov:

- ▶ Premenné $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ a konštanta 0 sú rekurzívne termy.
- ▶ Ak τ je rekurzívny term, potom aplikácie funkcie nasledovníka $S(\tau)$ a funkcie predchodcu $P(\tau)$ sú rekurzívne termy.
- ▶ Ak τ_1, τ_2, τ_3 sú rekurzívne termy, potom aplikácia diskriminačnej funkcie $D(\tau_1, \tau_2, \tau_3)$ je rekurzívny term.
- ▶ Ak $\tau_1, \dots, \tau_n$ sú rekurzívne termy, potom aplikácia n -árnej funkčnej premennej $f_n(\tau_1, \dots, \tau_n)$ je rekurzívny term.
- ▶ Ak $\rho_1, \dots, \rho_n$ sú rekurzívne termy a τ je rekurzívny term v premenných $x_1, \dots, x_n$ a funkčnej premennej f_n , potom aplikácia $(\lambda_n.\tau)(\rho_1, \dots, \rho_n)$ je rekurzívny term.

Tu $\lambda_n.\tau$ sa nazýva rekurzívny funkčný symbol.

Výpočtový model pre čiastočne rekurzívne funkcie

Interpretácia rekurzívnych termov a funkčných symbolov

Interpretáciu (denotáciu) rekurzívnych funkčných symbolov $\lambda_n.\tau$ definujeme indukciou na štruktúru rekurzívnych termov τ :

Nech $\tau[f_n; x_1, \dots, x_n]$ je rekurzívny term v premenných $x_1, \dots, x_n$ a funkčnej premennej f_n . Predpokladajme ďalej, že rekurzívne funkčné symboly vyskytujúce sa vo výraze τ sú interpretované podľa indukčného predpokladu. Potom rekurzívny funkčný symbol $\lambda_n.\tau$ interpretujeme ako čiastočnú funkciu f definovanú vzťahom

$$f(x_1, \dots, x_n) \simeq \tau[f; x_1, \dots, x_n].$$

Interpretáciu rekurzívneho funkčného symbolu $\lambda_n.\tau$ označujeme tým istým menom $\lambda_n.\tau$.

Výpočtový model pre čiastočne rekurzívne funkcie

Veta

Čiastočná funkcia je rekurzívna práve vtedy, keď je interpretáciou nejakého rekurzívneho funkčného symbolu.

Dôkaz.

- ▶ Indukciou na dĺžku rekurzívneho odvodu dokážeme, že každá čiastočne rekurzívna funkcia je interpretáciou nejakého rekurzívneho funkčného symbolu.
- ▶ Indukciou na štruktúru rekurzívneho termu τ dokážeme, že interpretácia rekurzívneho funkčného symbolu $\lambda_n.\tau$ je čiastočne rekurzívna funkcia.

Výpočtový model pre čiastočne rekurzívne funkcie

Monadické numerály

Výpočet prebieha na monadických numeráloch:

$$0 \quad S(0) \quad SS(0) \quad SSS(0) \quad SSSS(0) \quad \dots$$

Označenie:

- ▶ Ak x je prirodzené číslo, potom $\underline{x}$ je monadický numerál, ktorý denotuje číslo x :

$$\underline{x} \equiv \overbrace{S \dots S}^{x\text{-krát}}(0).$$

- ▶ Ak $x_1, \dots, x_n$ sú prirodzené čísla, potom

$$\underline{x_1, \dots, x_n} \equiv \underline{x_1}, \dots, \underline{x_n} \equiv \overbrace{S \dots S}^{x_1\text{-krát}}(0), \dots, \overbrace{S \dots S}^{x_n\text{-krát}}(0).$$

Výpočtový model pre čiastočne rekurzívne funkcie

Jeden krok výpočtu

Ak uzavretý rekurzívny term τ nie je numerál, tak musí obsahovať aspoň jeden podvýraz (*redex*) v tvare

$$P(\underline{x}) \quad D(\underline{x}, \sigma_2, \sigma_3) \quad (\lambda_n.\sigma)(\vec{x}).$$

Jeden výpočtový krok spočíva v nájdení najľavejšieho redexu a jeho nahradením kontrakciou podľa nasledujúcich pravidiel

$$\begin{aligned} P(\underline{x}) &\triangleright_1 \underline{x} \div 1 \\ D(\underline{0}, \sigma_2, \sigma_3) &\triangleright_1 \sigma_3 \\ D(\underline{x+1}, \sigma_2, \sigma_3) &\triangleright_1 \sigma_2 \\ (\lambda_n.\sigma[f_n; \vec{x}])(\vec{x}) &\triangleright_1 \sigma[\lambda_n.\tau; \vec{x}]. \end{aligned}$$

Tak dostaneme nový uzavretý rekurzívny term ρ a píšeme

$$\tau \triangleright_1 \rho.$$

Výpočtový model pre čiastočne rekurzívne funkcie

Viac krokov výpočtu

Označenie:

- ▶ $\tau_1 \triangleright_k \tau_2$, ak výraz τ_1 sa redukuje do výrazu τ_2 po k krokoch.
To znamená, že existujú uzavreté rekurzívne termy $\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_k$ také, že

$$\tau_1 \equiv \rho_0 \triangleright_1 \rho_1 \triangleright_1 \dots \triangleright_1 \rho_k \equiv \tau_2.$$

Umožníme tiež prípad $k = 0$. Vtedy $\tau_1 \triangleright_0 \tau_2 \leftrightarrow \tau_1 \equiv \tau_2$.

- ▶ $\tau_1 \triangleright \tau_2$, ak $\tau_1 \triangleright_k \tau_2$ pre nejaké k .
- ▶ Ak $\tau \triangleright \underline{x}$, tak vravíme, že výpočet skončil s výsledkom x .

Veta (Ekvivalentnosť definičnej a výpočtovej sémantiky)

Pre každý rekurzívny funkčný symbol $\lambda_n.\tau$ platí:

$$(\lambda_n.\tau)(\vec{x}) \simeq y \leftrightarrow (\lambda_n.\tau)(\vec{x}) \triangleright \underline{y}.$$

Aritmetizácia výpočtového modelu

Aritmetizácia rekurzívnych termov a funkčných symbolov

Pomocou párových konštruktorov z rôznymi rozlišovacími položkami:

$x_i = \langle 0, i \rangle$	(premenné)
$0 = \langle 1, 0 \rangle$	(konštanta 0)
$S(t) = \langle 2, t \rangle$	(aplikácia funkcie nasledovníka)
$P(t) = \langle 3, t \rangle$	(aplikácia funkcie predchodcu)
$D(t_1, t_2, t_3) = \langle 4, t_1, t_2, t_3 \rangle$	(podmienkový výraz)
$t_1 \bullet t_2 = \langle 5, t_1, t_2 \rangle$	(curryfikovaná aplikácia)
$e[ts] = \langle 6, e, ts \rangle$	(čiastočná aplikácia)
$f_n = \langle 7, n \rangle$	(funkčná premenná)
$\lambda_n. t = \langle 8, n, t \rangle$	(definovaná funkcia)

Notačná konvencia: $t_1 \bullet t_2 \bullet t_3 \equiv (t_1 \bullet t_2) \bullet t_3$.

Aritmetizácia výpočtového modelu

Aritmetizácia rekurzívnych termov a funkčných symbolov

Číslo $\ulcorner \tau \urcorner$ resp. $\ulcorner f \urcorner$ je kódom termu τ resp. funkčného symbolu f :

$$\ulcorner x_i \urcorner = x_i$$

$$\ulcorner 0 \urcorner = 0$$

$$\ulcorner S(\tau) \urcorner = S(\ulcorner \tau \urcorner)$$

$$\ulcorner P(\tau) \urcorner = P(\ulcorner \tau \urcorner)$$

$$\ulcorner D(\tau_1, \tau_2, \tau_3) \urcorner = D(\ulcorner \tau_1 \urcorner, \ulcorner \tau_2 \urcorner, \ulcorner \tau_3 \urcorner)$$

$$\ulcorner f(\tau_1, \dots, \tau_n) \urcorner = \ulcorner f \urcorner [\langle \ulcorner \tau_1 \urcorner, \dots, \ulcorner \tau_k \urcorner, 0 \rangle] \bullet \ulcorner \tau_{k+1} \urcorner \bullet \dots \bullet \ulcorner \tau_n \urcorner$$

kde k je najväčšie prirodzené číslo také,
že všetky termy $\tau_1, \dots, \tau_k$ sú numerály

$$\ulcorner f_n \urcorner = f_n$$

$$\ulcorner \lambda_{n.\tau} \urcorner = \lambda_n. \ulcorner \tau \urcorner.$$

Aritmetizácia výpočtového modelu

Príklad

Regulárna rekurzívna definícia

$$x + y = \text{if } x \neq 0 \text{ then } S(P(x) + y) \text{ else } y.$$

Rekurzívna definícia so silnou rovnosťou

$$x_1 + x_2 \simeq D(x_1, S(P(x_1) + x_2), x_2).$$

Rekurzívny funkčný symbol

$$\lambda_2.D(x_1, S f_2(P(x_1), x_2), x_2)$$

a jeho aritmetizácia

$$\lambda_2.D(x_1, S(f_2[0] \bullet P(x_1) \bullet x_2), x_2).$$

Aritmetizácia výpočtového modelu

Monadické numerály, časť prvá

Unárna operácia $\ulcorner \underline{x} \urcorner$ vytvorí kód numerálu $\underline{x} \equiv \overbrace{S \dots S}^{x\text{-krát}}(0)$:

$$\ulcorner \underline{x} \urcorner = \ulcorner \overbrace{S \dots S}^{x\text{-krát}}(0) \urcorner.$$

Primitívna rekurzívnosť funkcie $\ulcorner \underline{x} \urcorner$ plynie z tohoto vyjadrenia

$$\ulcorner \underline{0} \urcorner = \mathbf{0} \qquad \ulcorner \underline{x+1} \urcorner = S(\ulcorner \underline{x} \urcorner).$$

Jej inverzia je funkcia $Dc(t)$, ktorá dekoduje kód numerálu:

$$Dc(\ulcorner \underline{x} \urcorner) = x.$$

Primitívna rekurzívnosť funkcie $Dc(t)$ plynie z tohoto vyjadrenia

$$Dc(\mathbf{0}) = 0 \qquad Dc(S(t)) = Dc(t) + 1.$$

Aritmetizácia výpočtového modelu

Monadické numerály, časť druhá

Predikát $Nm(t)$ platí, ak číslo t je kódom nejakého numerálu:

$$Nm(t) \leftrightarrow \exists x \, t = \ulcorner \underline{x} \urcorner.$$

Jej charakteristická funkcia $Nm_*(t)$ je primitívne rekurzívna:

$$Nm_*(0) = 1$$

$$Nm_* S(t) = 1 \leftarrow Nm(t) = 1$$

$$Nm_* S(t) = 0 \leftarrow Nm(t) \neq 1$$

$$Nm_*(t) = 0 \leftarrow \neg(t = 0 \vee \exists t_1 \, t = S(t_1)).$$

Predikátová forma uvedenej definície

$$Nm(0)$$

$$Nm S(t) \leftarrow Nm(t).$$

Aritmetizácia výpočtového modelu

Kontrakcia argumentov

Binárna kontrakčná funkcia $t_1 \underline{\bullet} t_2$ spĺňa rovnosť

$$\ulcorner f(\tau_1, \dots, \tau_n) \urcorner = \ulcorner f \urcorner [\ulcorner \tau_1 \urcorner, \dots, \ulcorner \tau_k \urcorner, 0 \urcorner] \underline{\bullet} \ulcorner \tau_{k+1} \urcorner \underline{\bullet} \dots \underline{\bullet} \ulcorner \tau_n \urcorner.$$

Tu $\tau_1, \dots, \tau_k$ sú monadické numerály.

Primitívna rekurzívnosť funkcie plynie z tohoto vyjadrenia

$$t_1 \underline{\bullet} t_2 = \begin{cases} e[ts \oplus \langle t_2, 0 \rangle] & \text{ak } t_1 = e[ts] \text{ a } Nm(t_2) \text{ pre nejaké } e, ts, \\ t_1 \bullet t_2 & \text{ináč.} \end{cases}$$

Notačná konvencia:

$$t_1 \underline{\bullet} t_2 \underline{\bullet} t_3 \equiv (t_1 \underline{\bullet} t_2) \underline{\bullet} t_3.$$

Aritmetizácia výpočtového modelu

Substitúcia

Ternárna funkcia $t[e; rs]$ je aritmetizácia operácie substitúcie $\tau[\lambda_n.\sigma; \underline{x}]$ nad rekurzívnymi termami:

$$\ulcorner \tau \urcorner [\ulcorner \lambda_n.\sigma \urcorner; \langle \ulcorner \underline{x}_1 \urcorner, \dots, \ulcorner \underline{x}_n \urcorner, 0 \rangle] = \ulcorner \tau[\lambda_n.\sigma; \underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n] \urcorner.$$

Primitívna rekurzívnosť funkcie $t[e; rs]$ plynie z tohoto vyjadrenia

$$x_i[e; rs] = (rs)_{i \dot{-} 1}$$

$$0[e; rs] = 0$$

$$S(t)[e; rs] = S(t[e; rs])$$

$$P(t)[e; rs] = P(t[e; rs])$$

$$D(t_1, t_2, t_3)[e; rs] = D(t_1[e; rs], t_2[e; rs], t_3[e; rs])$$

$$(t_1 \bullet t_2)[e; rs] = t_1[e; rs] \bullet t_2[e; rs]$$

$$f_n[ts][e; rs] = e[ts]$$

$$(\lambda_n. t)[ts][e; rs] = (\lambda_n. t)[ts].$$

Aritmetizácia výpočtového modelu

Dve pomocné operácie

Špecifikácia:

$$P_n(\ulcorner \underline{x} \urcorner) = \ulcorner \underline{x} \dot{-} 1 \urcorner$$
$$D_n(\ulcorner \underline{x} \urcorner, t_2, t_3) = D(x, t_2, t_3).$$

Primitívna rekurzívnosť oboch funkcií plynie z tohoto vyjadrenia

$$P_n(0) = 0$$
$$P_n S(t) = t$$
$$D_n(0, t_2, t_3) = t_3$$
$$D_n(S(t_1), t_2, t_3) = t_2.$$

Aritmetizácia výpočtového modelu

Jeden krok výpočtu

Špecifikácia redukčnej funkcie $Rd(t)$:

$$Rd(\ulcorner \underline{x} \urcorner) = \ulcorner \underline{x} \urcorner \quad \text{ak } \tau \triangleright_1 \rho, \text{ potom } Rd(\ulcorner \tau \urcorner) = \ulcorner \rho \urcorner.$$

Primitívna rekurzívnosť funkcie plyní z tohoto vyjadrenia

$$Rd(0) = 0$$

$$Rd\ S(t) = S\ Rd(t)$$

$$Rd\ P(t) = Pn(t) \leftarrow Nm(t)$$

$$Rd\ P(t) = P\ Rd(t) \leftarrow \neg Nm(t)$$

$$Rd\ D(t_1, t_2, t_3) = Dn(t_1, t_2, t_3) \leftarrow Nm(t_1)$$

$$Rd\ D(t_1, t_2, t_3) = D(Rd(t_1), t_2, t_3) \leftarrow \neg Nm(t_1)$$

$$Rd(t_1 \bullet t_2) = t_1 \bullet Rd(t_2) \leftarrow \exists e \exists ts\ t_1 = e[ts]$$

$$Rd(t_1 \bullet t_2) = Rd(t_1) \bullet t_2 \leftarrow \neg \exists e \exists ts\ t_1 = e[ts]$$

$$Rd(\lambda_n. t)[ts] = t[\lambda_n. t; ts].$$

Záver

10. cvičenie (test)

- ▶ Výsledky s komentárom nájdete na webe.

11. cvičenie

- ▶ Začína v stredu o 09:50 v miestnosti F1-248.
- ▶ Pracujte samostatne.
- ▶ Úlohy odovzdať najneskôr do 12:00 v pondelok budúci týždeň.

12. prednáška

- ▶ Kleeneho veta o normálnej forme pre čiastočne rekurzívne funkcie.
- ▶ Enumeračná čiastočná funkcia (univerzálna čiastočná funkcia pre čiastočne rekurzívne funkcie).
- ▶ Efektívne operácie na rekurzívnych indexoch.